

Опасный карантинный вредитель

Коричнево-мраморный клоп (*Halyomorpha halys* Stål)



Распространение:

Европа: Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Лихтенштейн, Румыния, Сербия, Франция, Швейцария.

Азия: Китай, Корея, Тайвань, Япония.

Северная Америка: Канада, США.

Повреждаемые растения: Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, декоративные растения, сорную растительность.

Насекомое может питаться цветами гибискуса, плодами паслена черного, стеблем целозии, шпинатом, спаржей, стручками фасоли. В общей сложности для этого вида известно более 100 видов растений-хозяев.

Симптомы повреждений: появление падалицы, характерные проколы листьев и плодов с образованием некротических зон.

Пути распространения: с помощью транспортных средств и с грузами, особенно со строительными конструкциями, растениями (саженцами) и растительной продукцией из зоны его естественного распространения (Китай, Япония, Корея, Тайвань), из зон его недавнего распространения в США и стран Европы (Швейцария, Германия, Франция, Италия и т.д.).

Методы выявления и идентификации: Клопы выявляются визуальным методом. Взрослые клопы длиной 12-17 мм, коричневатые или сероватые, окраска в целом сильно варьирует. Характерной особенностью является наличие светлых колечек на усиках и чередующихся светлых и темных участков на видимом сверху тонком боковом крае брюшка. Ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью. Запаховые железы расположены на нижней стороне груди между первой и второй парами ног и на верхней стороне брюшка.



При обнаружении карантинных объектов извещать
Управление Россельхознадзора по Липецкой
области г. Липец, ул. Опытная, д.1
8 (4742) 79-46-39, e-mail: kar@rsn48.ru